

عملية إزالة الظفر

متى تتم عملية إزالة الظفر؟



يزال قسم من الظفر أو كله عندما ينمو في اللحم مؤدياً إلى التهاب أو ألم، أو لدى تعرض الظفر إلى التهاب فطري.

كيف؟

تجري العملية تحت البنج الموضعي و تستغرق بين العشرين و الثلاثين دقيقة. إضافة إلى إزالة الظفر ممكن أن يلجأ الطبيب إلى إزالة اللحم الملتهب مما يطيل فترة العملية.

نجاح العملية

هناك احتمال أن يعاود الظفر نموه في اللحم بعد العملية، وفي حال حدوث هذا يقوم الطبيب بإجراء عملية تؤدي إلى تقليص مساحة الظفر بمقدار الثلث لدى نموه مره أخرى. عندها تكون نسبة النجاح حوالي 90%.



المضاعفات

- قلما تحصل أهمها :
- إلتهاب مكان العملية
 - نزيف

نصائح عامة

- يستحسن أن يرافق المريض أو المريضة أحد الأقرباء أو الأصدقاء كي يصحبه (ها) الى المنزل بعد العملية.
- تجنب الرياضة لمدة أسبوعين على الأقل.
- في حال وجود ألم بعد العملية، يمكن أخذ البراسيتامول .
- يجب رفع الرجل بعد العملية مباشرة لمدة 6 – 12 ساعة للتقليل من النزيف.
- يمكن العودة للعمل بعد 24 - 72 ساعة من العملية (إذا كان العمل ليس بحاجة لجهد جسدي).
- ينصح بتغطيس الرجل التي أجريت لها العملية بماء فاتر مرتين يوميا لمدة 5 دقائق بعدها ضع مرهم يصفه لك الطبيب . قم بهذا لمدة أسبوعين.
- كي تقلل من مشكلة نمو الظفر في اللحم عليك بقص الأظافر بطريقة مستقيمة، وعدم إنتعال حذاء ضيق عند الأصابع.
- يجب التغيير على الجرح في العيادة بعد 3 أيام من العملية.

في حال وجود أي إستفسار لا تتردد (ي) في سؤال طبيبك.
لإزالة ظفرك نرجو منك الحضور،

الساعة _____ يوم _____ الموافق _____ .