هل تريد أن تعرف؟

L03
sheet 1/1

تنظير المثانة
Cytoscopy

التعريف

هو عمل منظاري يتطلب إستعمال معدات وأجهزة متطورة تمكّن الجرَّاح من رؤية المسالك البولية عبر إدخال منظار في مجرى البول حتى المثانة.
يجرى التنظير تحت البنج الموضعي وهو مادة لزجة تخدر المسلك. يستغرق هذا العمل الجراحي ١٠ الى ١٥ دقيقة. بإمكان المريض مشاهدة ما يقوم به الطبيب عبر جهاز الفيديو. وهذا الإجراء غير مؤلم ولكنه قد يسبب إزعاجاً بسيطاً.

ما يجب أن تعرفه؟

قبل التنظير

- لا يوجد تحضيرات معينة .يمكن للمريض أن يأكل أو يشرب قبل العمل الجراحي.
- يجب إعلام الطبيب بتناول أي دواء مسيل للدم، (كالأسكربتين، أسبرين، بلافيكس، وسنتروم). حيث قد يتطلب الأمر إيقاف تناول هذه الأدوية من ٥ إلى ٧ أيام قبل عملية التنظير.

بعد المنظار

- يمكن مزاولة العمل كالمعتاد، وربما يشعر المريض بحريق أو وجود بعض الدم أثناء التبوّل. لذا يجب شُرب الماء بكثرة لإزالة هذه العوارض.
- إتصل بطبيبك في حال:
  - إرتفاع الحرارة
  - إنزعاج شديد عند التبول
  - عدم التمكن من التبول بعد حوالي ٦ ساعات من التنظير
  - نزيف حار

إرشادات

جميع الحقوق محفوظة، ٢٠٠٦، الجامعة الأميركية في بيروت المركز الطبي

إن المعلومات الواردة هي لهدف التثقيف فقط. يجب استشارة الطبيب في حال تطابق أي من العوارض الواردة ضمنا.
تم تحضير هذه النشرة من قبل قسم الخدمات التمريضية بالتنسيق مع جهات طبية اخرى.

© 2005 American University of Beirut Medical Center