

هل سأتمكن من تناول الطعام والكلام في ما بعد؟

نعم ستتمكن من تناول الطعام والتحدث و لكن مع الاخذ في عين الاعتبار :  
درجة الوعي لديك.  
نوعية الجهاز المستخدم.  
مساعدة أختصاصي في تقويم النطق .

هل سيتم اغلاق الفتحة لاحقا؟

يمكن اغلاق هذه الفتحة بعد فترة وفقا لحالتك.سيقوم طبيبك بالتقييم هذا مع الوقت.

ما الذي يجب ان افعله عندما أصبح في المنزل؟

في المنزل ينبغي عليك ان تراقب علامات الالتهاب ، تنظيف الأنبوب وفقا لتوصيات / والتعليمات الصادرة عن المستشفى قبل مغادرته.

لا تتردد في الاتصال بطبيبك عند الحاجة .

## Tracheostomy. معلومات أساسية.



American University of Beirut

Faculty of  
Health Sciences

PO Box 11-0236, Riad El  
Solh 1107 2020, Beirut,  
Lebanon



## ما هي فوائدها؟

الميزة الرئيسية لهذه العملية هو تسهيل التنفس وكذلك :  
تحسين ازالة الافرازات.  
الغطاء من التهوية الميكانيكية.  
مغادرة المستشفى سيكون أسهل.

## اين يتم أداؤها؟

يتم اجراؤها عادة في غرفة العمليات ولكن في بعض المستشفيات يمكن ان تجرى في وحدة التمريض.

## ما هي مدتها ؟

اذا كان سيتم اجراؤها في غرفة العمليات تستغرق حوالى الساعة اما اذا كان على وحدة التمريض سوف تستغرق ٣٠ الى ٤٥ دقيقة.

## كيف يتم التحضير لهذا الاجراء؟

قبل العملية يتم اجراء سلسلة من فحوصات الدم .  
تتوقف التغذية عندمنتصف الليل.  
ايقاف الادوية المسيلة للدم.

## هل سأشعر بالألم؟

تجرى هذه العملية تحت تأثير تخدير عام .  
سوف تشعر ببعض الألم بعد العملية على مستوى العنق وسيقوم طبيبك بوصف بعض المسكنات.


## ما هي Tracheostomy؟

عملية جراحية على مستوى العنق تتمكن من خلالها من التنفس و اخراج الإفرازات

## متى تتم ؟

تتم اذا كان لديك واحد او عدد من هذه المشاكل.

- انسداد جزئي في القسم العلوي من الحنجرة. (السرطان)
- أذى شديد في الفم.
- استنشاق المواد سامة.
- بقاء أنبوب التنفس في الفم لمدة طويلة او عدم القدرة على وضعه أساساً.



## هل هي خطيرة؟

ستتم مراقبتك طوال العملية من خلال اجهزة مراقبة .  
التعقيدات التي يمكن ان تحدث خلالها :  
-انخفاض نسبة الأوكسجين في الدم .  
-انخفاض في ضغط الدم .  
-زيادة في دقات القلب .  
-تجمع الهواء الزائد في الرئتين .

## ما يمكن ان يحدث بعد العملية؟

هذه المضاعفات قد تحدث بعد العملية بشكل مباشر أو على المدى الطويل :  
- نزيف من موقع العملية .  
- خروج كلي للأنبوب من مكانه .  
- التهابات (احمرار في موقع العملية , وجود افرازات ( عمل)).  
- تديق في الزلعموم (طويل المدى) .

## متى تمنع العملية؟

اذا كانت العلامات الحيوية مثل دقات القلب وضغط الدم غير مستقرة .  
اي من فحوصات دمك غير طبيعية .  
خلل في طبيعة الرقبة .

سيخبرك طبيبك عن جميع الموانع الخاصة بك .

