هل تريد أن تعرف؟

H01
sheet 1/1

الجراحة الدماغية
Craniotomy

التعريف

إنه إجراء شق جراحي في الجمجمة، بهدف إزالة أي تكتل أو ورم، أو سحب وتفريغ ترسب أو تراكم الدم.

ما يجب أن تعرفه؟

الأدوية

تناول الأدوية حسب إرشادات الطبيب بشكل منتظم.

الطعام والحمية

تناول وجبة صحية عادية. ليس عليك إتباع حمية غذائية معيّنة، ما لم يكن هناك توصية خاصة من الطبيب.

النشاط البدني والحركة

- من المفضل مرافقة أحد لك خلال عملك أو نشاطك اليومي العادي، خوفاً من إصابتك بدوخة أو تشنج أو صرع حتى يسمح الطبيب لك بالذهاب بمفردك.
- مارس النشاط الجسدي قدر المستطاع، مع أخذ قسط كافٍ من الراحة من وقت إلى آخر.

الخيارات العلاجية

- من الطبيعي بعد الجراحة أن تشعر بتنميل أو حكاك خفيف مكان العملية وذلك لمدة ٦ أشهر تقريباً.
- حافظ على نظافة الشعر والرأس وجفافهما لمنع حدوث أي إلتهاب.
- إرتد غطاء رأس نظيف أوخوذة، وذلك لحماية فروة الرأس من التحسس.
- تجنب الضوضاء لأنها تسبب لك الإزعاج الصحي.

إجراءات وقائية

- أعلم الطبيب فوراً عند الشعور بالصداع أو الدوخة أو أعراض غير عادية مثل رؤية مشوشة، ازدواج في الرؤية.
- أعلم الطبيب عن أي اجهاد أو خوف ينتابك.
- إستشر الطبيب حول متى تستطيع مزاولة العمل وإتبع الاجراءات المحددة التي يوصي بها الطبيب.

إرشادات

جميع الحقوق محفوظة، ٢٠٠٦، الجامعة الأميركية في بيروت المركز الطبي

إن المعلومات الواردة هي لهدف التثقيف فقط. يجب استشارة الطبيب في حال تطابق أي من العوارض الواردة ضمنا.
تم تحضير هذه النشرة من قبل قسم الخدمات التمريضية بالتنسيق مع جهات طبية اخرى.

© 2005 American University of Beirut Medical Center